

助産業務ガイドライン 2019 内容訂正のお知らせ

2021.12.10 更新

『助産業務ガイドライン 2019』の記載内容に訂正がございましたのでお知らせ致します。

◆53 ページ

図8 分娩予約・同意書（案）の骨盤位の場合

変更前→●骨盤位が変わらない場合は、嘱託または連携医療機関を受診し、合意に基づき分娩方針が決まります。

変更後→●嘱託または連携医療機関の管理となります。

◆61 ページ

3) 新生児のビタミンK投与 (2) 投与方法

日本小児科学会より「新生児と乳児のビタミン K 欠乏性出血症発症予防に関する提言」が示されました。以下のサイトをご参照ください。

▼新生児と乳児のビタミン K 欠乏性出血症発症予防に関する提言

(日本小児科学会ほか：2021年11月30日)

http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20211130_VK_teigen.pdf

▼[医療者向け] 新生児・乳児ビタミン K 欠乏性出血症の予防法に関する Q&A について

(日本小児科学会新生児委員会：2021年11月30日)

http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20211130_VK_i.pdf

◆10 ページ (2021年3月22日刷にて、以下の内容へ変更済)

表中「C. 産婦人科医師が管理すべき対象者」

・「[C-4. 産科的既往がある妊婦] 対象疾患の『Rh(-)を含む血液型不適合妊娠の既往』を削除。

・「[C-1. 合併症のある妊婦] 対象疾患に、『Rh(-)を含む血液型不適合妊娠(疑いを含む)』を追加。

◆12 ページ (2020年4月1日刷にて、以下の内容へ変更済)

訂正前 →注 1) 5. 意識レベル:Japan coma scale(JSC, 3-3-9 度方式)を使用し, すなわち… (本文省略) …,1 桁を異常とする.

訂正後 →注 1) 5. 意識レベル:Japan coma scale(JCS, 3-3-9 度方式)を使用し, すなわち… (本文省略) …,1 桁を**閾値**とする.